Antibiotica voor landbouwhuisdieren



Praktisch sterk. Doordacht gebruik(t).

ALIVIRA

PRODUCTEN	ACTIEVE STOF	DOELDIERSOORT & WACHTTIJDEN*	DOSERING & TOEDIENING*	INDICATIES VOOR GEBRUIK*

* Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de bijsluiter op het ogenblik van creatie van deze brochure en is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg actuele bijsluiters voor de meest recente informatie.

Citramox LA 150 mg/ml

Suspensie voor injectie voor runderen en varkens

Beschikbaar in 100 ml & 250 ml

BE-V572151



Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Amoxicilline 150 mg
(overeenkomend met 172,2 mg amoxicilline trihydraat)

Vlees enslachtafval:
18 dagen
Melk:
3 dagen

Vlees en slachtafval:
20 dagen

Intramusculair gebruik

15 mg amoxicilline/kg LG (1 ml/10 kg LG)

De toediening dient eenmalig na 48 uur te worden herhaald

Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida

Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Pasteurella multocida

Diergeneesmiddel op voorschrift. Aanvullende productinformatie op de achterzijde.

Flortekxin 300 mg/ml + 16,5 mg/ml

Oplossing voor injectie voor runderen

Beschikbaar in 100 ml & 250 ml

BE-V662332



Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Florfenicol 300 mg
Flunixine 16,5 mg
(flunixine meglumine)

Vlees en slachtafval:
46 dagen

Melk:
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren

Subcutaan gebruik

Uitsluitend in de nek

40 mg/kg florfenicol en 2,2 mg/kg flunixine (2 ml/15 kg LG) toedienen via een enkelvoudige subcutane injectie

Behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Mycoplasma bovis, die gepaard gaan met koorts

Diergeneesmiddel op voorschrift. Aanvullende productinformatie op de achterzijde.

Labimycin LA 300 mg/ml

Oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens

Beschikbaar in 100 ml & 250 ml

BE-V663500



Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Oxytetracycline 300 mg
(overeenkomend met 323,5 mg oxytetracyclinedihydraat)

Vlees en slachtafval:
35 dagen
Melk:
10 dagen (240 uren)

Vlees en slachtafval:
35 dagen
Melk:
9 dagen (216 uren)

Vlees en slachtafval:
28 dagen

Intramusculair gebruik

Een enkele dosis van 20 mg oxytetracycline/kg LG (1 ml/15 kg LG) om een werkingsduur van 3 tot 4 dagen te bereiken of in een enkele dosis van 30 mg/kg LG (1 ml/10 kg LG) om een werkingsduur van 5 tot 6 dagen te bereiken

Biggen (op basis van leeftijd):
1 dag: 0,2 ml
7 dagen: 0,3 ml
14 dagen: 0,4 ml
21 dagen: 0,5 ml

Behandeling van systemische, respiratoire, urinaire en lokale infecties. Specifieke indicaties zijn pasteurellose, pneumonie, atrofische rhinitis, erysipelas, artritis, omfalitis en ondersteunende therapie van intramammaire infecties

Diergeneesmiddel op voorschrift. Aanvullende productinformatie op de achterzijde.

PRODUCTEN	ACTIEVE STOF	DOELDIERSOORT & WACHTTIJDEN*	DOSERING & TOEDIENING*	INDICATIES VOOR GEBRUIK*

* Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de bijsluiter op het ogenblik van creatie van deze brochure en is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg actuele bijsluiters voor de meest recente informatie.

Peniyet vet 300 mg/ml

Suspensie voor injectie voor runderen, schapen en varkens

Beschikbaar in 100 ml & 250 ml



WACHTTIJD VOOR MELK

BE-V541520

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:

Procaïne benzylpenicilline monohydraat 300 mg (overeenkomend met 170,4 mg benzylpenicilline)

Vlees en slachtafval:
6 dagen voo reen behandelingsduur van 3-5 dagen, 8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Melk:
96 uren (4 dagen)

Vlees en slachtafval:
4 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen, 6 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Melk:
156 uur (6,5 dagen)

Vlees en slachtafval:
6 dagen voor een behandelingsduur van 3-5 dagen, 8 dagen voor een behandelingsduur van 6-7 dagen

Intramusculair gebruik
Goed schudden voor gebruik

10 mg procaïne benzylpenicilline (= 5,66 mg benzylpenicilline)/kg LG (1 ml/30 kg LG) per dag.

De behandeling duurt 3 tot 7 dagen

Behandeling van systemische infecties bij runderen, schapen en varkens veroorzaakt door of geassocieerd met bacteriën die gevoelig zijn voor benzylpenicilline

Diergeneesmiddel op voorschrift. Aanvullende productinformatie op de achterzijde.

Tulaject 100 mg/ml

Oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens

Beschikbaar in 100 ml



BE-V575217

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:

Tulathromycine 100 mg

Vlees en slachtafval:
22 dagen

Subcutaan gebruik
Eenmalige subcutane injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg LG (1 ml/40 kg LG)

Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het rund (BRD) die geassocieerd zijn met Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis gevoelig voor tulathromycine

Vlees en slachtafval:
16 dagen

Intramusculair gebruik
Eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg LG (1 ml/40 kg LG) in de nek

Behandeling van de vroege stadia van infectieuze pododermatitis (rotkreupel) geassocieerd met virulente Dichelobacter nodosus, die een systemische behandeling vereist

Vlees en slachtafval:
13 dagen

Intramusculair gebruik
Eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg LG (1 ml/40 kg LG) in de nek

Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het varken (SRD) die geassocieerd zijn met Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis en Bordetella bronchiseptica gevoelig voor tulathromycine

Diergeneesmiddel op voorschrift. Aanvullende productinformatie op de achterzijde.

Citramox LA 150 mg/ml

Citramox LA 150 mg/ml suspensie voor injectie voor runderen en varkens Dosering en toediening: bij runderen, niet meer dan 20 ml van het diergeneesmiddel per injectieplaats toedienen. Bij varkens, niet meer dan 6 ml van het diergeneesmiddel per injectieplaats toedienen. Voor elke toediening moet er een afzonderlijke injectieplaats worden gebruikt.Contra-indicaties: niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillines, cefalosporines of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken in geval van ernstige nierinsufficiëntie met anurie en oligurie. Niet gebruiken bij konijnen, hazen, hamsters, cavia's of andere kleine herbivoren. Niet toedienen aan paardachtigen, omdat amoxicilline (evenals alle aminopenicillines) een negatieve invloed kan hebben op de bacteriële flora van de blindedarm. Niet intraveneus toedienen. Bijwerkingen: rund: onbepaalde frequentie (kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens): overgevoeligheidsreacties[1] (zoals urticaria, anafylactische shock), verhoogde leverenzymen, reactie op plaats van injectie[2], zwelling op plaats van injectie[2]. Varken: onbepaalde frequentie (kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens): overgevoeligheidsreacties[1] (zoals urticaria, anafylactische shock), verhoogde leverenzymen, verharding op de injectie plaats[1] 1: in ernst variërend. 2: met lage intensiteit en spontaan en snel verdwijnend. Speciale waarschuwingen: het diergeneesmiddel is niet werkzaam tegen bèta-lactamase producerende organismen. Er is volledige kruisresistentie aangetoond tussen amoxicilline en andere penicillines, met name aminopenicillines. Gebruik van het diergeneesmiddel/amoxicilline dient zorgvuldig te worden overwogen wanneer gevoeligheidsbepalingen resistentie voor penicillines hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn. Houdbaarheid: houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. Meerlaagse polypropyleen-/ethyleenvinylalcohol/polypropyleen injectieflacon. Marketing authorization holder: Laboratorios Karizoo S.A.

Link SKP (BE)

Flortekxin 300 mg/ml + 16,5 mg/ml

Flortekxin 300 mg/ml + 16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen Dosering en toediening: het volume dat per injectie wordt toegediend, mag niet meer zijn dan 10 ml. Het wordt aanbevolen dieren te behandelen in het vroege stadium van de ziekte en de respons op de behandeling te evalueren binnen 48 uur na injectie. Het ontstekingsremmende bestanddeel van het diergeneesmiddel, flunixine, kan een slechte bacteriologische respons op florfenicol maskeren in de eerste 24 uur na injectie. Als de klinische verschijnselen van de ademhalingsziekte aanhouden of toenemen, of als een terugval optreedt, dient de behandeling gewijzigd te worden door het gebruik van een ander antibioticum en voortgezet te worden tot de klinische verschijnselen verdwenen zijn. Contra-indicaties: niet gebruiken bij volwassen stieren die voor de fokkerij bestemd zijn. Niet gebruiken bij dieren die lijden aan leveren nieraandoeningen. Niet gebruiken als er een risico bestaat op gastro-intestinale bloeding of bij een bloedstollingsstoornis. Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hartaandoeningen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: rund: zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): anafylactische reacties (soms fataal), onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens): zwelling op de injectieplaats[1], irritatie op de injectieplaats[2]. 1: wordt 2-3 dagen na de injectie voelbaar. De duur van de zwelling varieerde van 15-36 dagen na de injectie. 2: Minimale tot milde irritatie van de subcutis. Uitbreiding naar de onderliggende spier werd slechts in enkele gevallen waargenomen. 56 dagen na de injectie werden geen ernstige letsels meer waargenomen die bij de slacht zouden moeten worden weggesneden. Speciale waarschuwingen: kruisresistentie is aangetoond tussen florfenicol en chlooramfenicol. Gebruik van het diergeneesmiddel dient zorgvuldig overwogen te worden indien gevoeligheidsbepalingen resistentie voor florfenicol en andere amfenicolen hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn. Ondanks een afname van de pathogeenbelasting van Mycoplasma bovis, is het mogelijk dat Mycoplasma bovis niet volledig geëlimineerd wordt uit de longen na behandeling met het diergeneesmiddel. Er is geen uitroeiing van de bacterie Mycoplasma bovis. Houdbaarheid: houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. COEX (PP/kleefstof/EVOH/kleefstof/PP) injectieflacon. Marketing authorization holder: Laboratorios Karizoo S.A.

Link SKP (BE)

Labimycin LA 300 mg/ml

Labimycin LA 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens Dosering en toediening: het maximale injectievolume per injectieplaats is 10 ml (voor runderen), 7 ml (voor varkens) en 5 ml (voor schapen). Contra-indicaties: niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij dieren met nieren/of leverinsufficiëntie. Bijwerkingen: rund, schaap, varken: zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): zwelling op de injectieplaats[1], verharding op de injectieplaats[1]. Zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): overgevoeligheidsreactie[2], anafylaxie[2], fotosensitiviteit[3]. 1: Milde reacties kunnen tot 1 tot 4 weken worden waargenomen. 2: Soms dodelijk. Dien passende symptomatische behandeling toe. 3: Vooral bij dieren met weinig huidpigmentatie, onder invloed van intens zonlicht. Speciale waarschuwingen: kruisresistentie is aangetoond tussen oxytetracycline en andere tetracyclines. Het gebruik van oxytetracycline moet zorgvuldig worden afgewogen indien gevoeligheidsbepalingen resistentie voor tetracyclines hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn. Houdbaarheid: houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. Bewaren beneden 25 °C. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Amberkleurige type I glazen injectieflacon. Marketing authorization holder: Labiana Life Sciences, S.A.

Link SKP (BE)

Peniyet vet 300 mg/ml

Peniyet vet 300 mg/ml suspensie voor injectie bij runderen, schapen en varkens Dosering en toediening: injecteer niet meer dan 2,5 ml per injectieplaats bij varkens. Injecteer niet meer dan 12 ml per injectieplaats bij runderen. Injecteer niet meer dan 2 ml per injectieplaats bij schapen. Als er binnen 3 dagen geen klinische respons wordt waargenomen, stel dan opnieuw de diagnose en schrijf zo nodig een verandering van de behandeling voor. De juiste behandelingsduur moet worden gekozen op basis van de klinische behoeften en het individuele herstel van het behandelde dier. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid van het doelweefsel en de kenmerken van het doelpathogeen.Contra-indicaties: niet intraveneus injecteren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, penicillinen, cefalosporinen, procaïne of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij ernstige nierfunctiestoornissen met anurie en oligurie. Niet gebruiken in aanwezigheid van β-lactamase producerende pathogenen. Niet gebruiken bij zeer kleine herbivoren, zoals cavia's, gerbils en hamsters. Bijwerkingen: runderen: zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren): anafylactische reactie[1], overgevoeligheidsreactie[2], anafylactische shock[2]. 1: Kan worden veroorzaakt door het povidon-gehalte. 2: Kan worden veroorzaakt door penicillinen en cefalosporinen na toediening. Kan in sommige gevallen ernstig zijn. Schapen: zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren): overgevoeligheidsreactie[1], anafylactische shock[1] 1: Kan worden veroorzaakt door het povidon-gehalte. Varkens: zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren): Pyrexie[1], lusteloosheid[1], systemische stoornis[2]; braken[1]; rillingen[1], coördinatiestoornis[1]; vaginale afscheiding[3]; overgevoeligheidsreactie[4], anafylactische shock[4] 1: Bij zogende en mestvarkens. Kan worden veroorzaakt door het vrijkomen van procaïne. 2: Bij jonge biggen zijn toxische effecten waargenomen. Deze zijn van voorbijgaande aard, maar kunnen potentieel dodelijk zijn, vooral bij hogere doses. 3: Bij drachtige zeugen en gelten. Kan in verband worden gebracht met abortus. 4: Kan worden veroorzaakt door penicillinen en cefalosporinen na toediening. Kan in sommige gevallen ernstig zijn. Speciale waarschuwingen: volledige kruisresistentie is aangetoond tussen benzylpenicilline procaïne en andere penicillinen. Na absorptie dringt benzylpenicilline slecht door in de biologische membranen (bijv. de bloedhersenbarrière) omdat het geïoniseerd is en een slechte lipideoplosbaarheid heeft. De bactericide werking van penicilline wordt tegengegaan door bacteriostatische geneesmiddelen. Het effect van aminoglycosiden kan worden versterkt door penicillinen. De excretie van benzylpenicilline wordt verlengd door acetylsalicylzuur. Cholinesteraseremmers vertragen de afbraak van procaïne. Het gebruik van dit diergeneesmiddel voor de behandeling van meningitis of CZS-infecties als gevolg van bijv. Streptococcus suis of Listeria monocytogenes is mogelijk niet doeltreffend. Bovendien dringt benzylpenicilline niet goed zoogdiercellen binnen en heeft dit diergeneesmiddel derhalve mogelijk weinig effect bij de behandeling van intracellulaire pathogenen, bijv. Listeria monocytogenes. Verhoogde MIC-waarden of bimodale distributieprofielen die wijzen op verworven resistentie zijn gemeld voor de volgende bacteriën: Glaesserella parasuis, Staphylococcus spp. als veroorzaker van MMA/PPDS, Streptococcus spp. En S. suis bij varkens; Fusobacterium necrophorum als veroorzaker van metritis en Mannheimia haemolytica (alleen in sommige lidstaten), evenals Bacteroides spp., Staphylococcus chromogenes, Actinobacillus lignieresii en Trueperella pyogenes bij runderen. Het gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot een gebrek aan klinische werkzaamheid bij de behandeling van infecties die door deze bacteriën zijn veroorzaakt. Houdbaarheid: houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. Bewaren in een koelkast (2 °C-8 °C). Bewaar de injectieflacon/fles in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Polyethyleentereftalaat (PET) kleurloze injectieflacon. Marketing authorization holder: Laboratorios Syva, S.A.

Link SKP (BE)

Tulaject 100 mg/ml

Tulaject 100 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, varkens en schapen Doeldiersoorten en wachttijden: niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus. Dosering en toediening: rund: voor behandeling van runderen met een lichaamsgewicht van meer dan 300 kg dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat er op één plaats niet meer dan 7,5 ml geïnjecteerd wordt. Varken: voor behandeling van varkens met een lichaamsgewicht van meer dan 80 kg dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat er op één plaats niet meer dan 2 ml geïnjecteerd wordt. Voor elke respiratoire aandoening wordt aanbevolen om de dieren in een vroeg stadium van de ziekte te behandelen en de respons op de behandeling binnen 48 uur na injectie te evalueren. Als de klinische verschijnselen van de ademhalingsaandoening blijven bestaan of verergeren, of als er een terugval optreedt, dient de behandeling te worden gewijzigd, waarbij een ander antibioticum gebruikt dient te worden en de behandeling dient te worden voortgezet tot de klinische verschijnselen verdwenen zijn. Indicaties: rund: de aanwezigheid van de ziekte in de groep moet vastgesteld zijn voor het diergeneesmiddel gebruikt wordt. Behandeling van infectieuze bovine keratoconjunctivitis (IBK) geassocieerd met Moraxella bovis gevoelig voor tulathromycine. Varken: de aanwezigheid van de ziekte in de groep moet vastgesteld zijn voor het diergeneesmiddel gebruikt wordt. Het diergeneesmiddel dient alleen gebruikt te worden als verwacht wordt dat de varkens binnen 2-3 dagen ziek zullen worden. Contra-indicaties: niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, voor macrolide antibiotica of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: rund: zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): zwelling op de injectieplaats[1], fibrose op de injectieplaats[1], bloeding op de injectieplaats[1], oedeem op de injectieplaats[1], reactie op de injectieplaats[1,2], pijn op injectieplaats [1,3] 1: Kan tot ongeveer 30 dagen na injectie aanhouden. 2: Omkeerbare veranderingen van congestie. 3: Van voorbijgaande aard. Varken: zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): reactie op de injectieplaats[1,2], fibrose op de injectieplaats[1], bloeding op de injectieplaats[1], oedeem op de injectieplaats[1] 1: Kan tot ongeveer 30 dagen na injectie aanhouden. 2: Omkeerbare veranderingen van congestie. Schaap: zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): ongemak[1] 1: Van voorbijgaande aard, verdwijnt binnen enkele minuten: kopschudden, wrijven op de injectieplaats, terugdeinzen. Speciale waarschuwingen: kruisresistentie met andere macroliden komt voor. Niet tegelijkertijd toedienen met antimicrobiële middelen met een soortgelijk werkingsmechanisme, zoals andere macroliden of lincosamiden. Schaap: de werkzaamheid van de antimicrobiële behandeling van rotkreupel kan verminderd worden door andere factoren, zoals natte omgevingsomstandigheden, alsook ongepaste bedrijfsvoering. Behandeling van rotkreupel moet daarom samen met andere aanpassingen in het koppelmanagement worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het verstrekken van een droge omgeving. Antibiotische behandeling van goedaardige rotkreupel wordt niet wenselijk geacht. Tulathromycine toonde beperkte werkzaamheid bij schapen met ernstige klinische verschijnselen of met chronische rotkreupel, en moet daarom alleen worden gegeven in een vroeg stadium van rotkreupel. Houdbaarheid: houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen. Type I heldere glazen injectieflacon. Marketing authorization holder: Alivira Animal Health Limited

Link SKP (BE)

Alivira NV/SA
Alivira Animal Health

Kolonel Begaultlaan 1A-B14
3012 Leuven
Belgium

T + 32 16 84 19 79
M info@alivira.org
W alivira.be

ALIVIRA